



風疹の抗体が低いと言われたお母さんへ

- ④ 風疹に感染し発症してしまうと高熱が続いたり、発疹が出たり大人の場合は症状が強く出ることがあります。
風疹の抗体が不十分な妊婦さんが妊娠初期に感染すると、先天性風疹症候群の子どもが生まれることがあります。
もしかして抗体の不十分な妊婦さんが周りにいらっしゃるかもしれません。
ご自身とこれから生まれてくるかもしれない赤ちゃんのため、そして周りにうつさないためにワクチンを受けましょう。
- ④ 風疹と同時に麻疹(はしか)のワクチンもおすすめしています。
過去にワクチンを受けられていない方はもちろん、
ワクチン接種歴が不明な方そしてワクチンを受けられた方も抗体価が下がっていることがあります。
麻疹はとても感染力が強く、抗体が下がっていると感染を受け発症することがあります。
ワクチンを受ければ防げることが多いです。
麻疹風疹の混合ワクチンだと 1 本で両方がカバーできます。
助成券があると 4000 円の自己負担で受けていただけます。ぜひご検討ください。

 風疹ワクチン	5000 円	助成券があると→無料
 麻疹風疹混合ワクチン	9000 円	助成券があると→4000 円



※赤ちゃんのお父さんも麻疹、風疹、その他感染症の抗体検査やワクチンを受けていただけます。
助成が出ることもあります。この機会にぜひご検討ください。

✧ 詳しくはスタッフまでお問い合わせください ✧

